TUMORRISIKO VON MENSCHEN MIT LYNCH-SYNDROM

Tumorrisiko von Menschen mit Lynch-Syndrom bis zum 75. bzw. 65. Lebensjahr nach betroffenem DNA-Reparaturgen und Geschlecht - im Vergleich zum Lebenszeitrisiko* der Allgemeinbevölkerung (in %).

Tumorart	MLH1 bis 75 Jahre		MSH2 bis 75 Jahre		MSH6 bis 75 Jahre		PMS2** bis 65 Jahre		Lebenszeitrisiko* Allgemeinbevölkerung	
F=Frauen / M=Männer	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Alle	69	80	81	83	29	55	30	17	45	52
Dick- und Mastdarm	56	48	56	43	16	17	10	5	7	5
Gebärmutter (Endometrium)	–	37	–	44	–	46	–	13	–	2
Eierstöcke	–	8	–	13	–	6	–	3	–	1
Dünndarm	8	5	7	4	3	1	3	2	<1	<1
Magen	9	4	8	4	1	1	3	0	2	1
Pankreas	3	4	3	4	1	2	0	0	2	2
Gallengänge	4	2	5	2	0	0	0	0	1	1
Nierenbecken / Harnleiter	5	3	16	20	3	4	0	0	<1	<1
Harnblase	6	5	13	9	9	3	0	0	3	1
Gehirn	1	1	7	2	1	1	0	7	1	1
Prostata	16	–	24	–	7	–	3	–	14	–



**Lebenszeitrisiko:* *das Risiko, innerhalb des gesamten Lebens an einem Tumor zu erkranken; M-Männer; F-Frauen; Quellen: Dominguez-Valentin, EClinicalMedizine (2023): doi: 10.1016/ j.eclinm.2023.101909. Krebs in Deutschland 2019/2020, RKI (2023). doi: 10.25646/11357*

*** Für **PMS2** liegen nur wenige prospektive Daten vor, daher Angaben nur bis 65 J. und nur eingeschränkt aussagekräftig.*

SemiColon
Netzwerk für Menschen
mit Lynch-Syndrom
und erblichem Darmkrebs